

COMUNICATO STAMPA

Probiotico sigma-tau riceve l'avallo dell'American College of Gastroenterology per il trattamento della colite ulcerosa

La guida pratica aggiornata dell'America College of Gastroenterology (ACG) ha inserito il probiotico "VSL# 3" della sigma-tau nel trattamento terapeutico della colite ulcerosa nell'adulto.

La decisione dell' ACG è dovuta anche ai risultati di uno studio italiano randomizzato pubblicato sull'importante rivista scientifica "American Journal of Gastroenterology", in cui si evidenzia che la somministrazione di VSL#3 in associazione con un antinfiammatorio intestinale (balsalazide), comporta la remissione della colite ulcerosa in pazienti affetti da forme lievi o moderate. In particolare i ricercatori italiani hanno dimostrato che il trattamento combinato ha guarito i pazienti coinvolti nello studio mediamente in quattro giorni. In pratica la metà dei giorni necessari con la terapia tradizionale.

"Abbiamo appena iniziato a comprendere i meccanismi e la complessità dei probiotici - ha commentato il prof. Steven Faber della Albermarle Gastroenterology Associates, Elisabeth City, NC - e siamo oramai certi che lo stress, l'abitudine a mangiar male e l'uso indiscriminato degli antibiotici, alterano profondamente la flora batterica intestinale. Da questo studio - ha concluso Faber - emerge la necessità che i medici comprendano l'importanza terapeutica del ristabilimento ottimale dell'ambiente intestinale".

In Italia sono oltre centomila i pazienti affetti da colite ulcerosa, malattia fortemente invalidante che incide pesantemente sulla qualità della vita, che potrebbero trarre giovamento da questo nuovo approccio terapeutico.

Roma 19 luglio 2005

Ufficio Stampa
sigma-tau